



De genoemde voeders zijn voordelig te koop afgehaald bij onze winkel in Sinderen of bezorgd op route in de Achterhoek. Woont uw elders in Nederland, dan bestelt u per zak eenvoudig via www.grevers-winkel.nl of (gecombineerd met andere voeders) per palletje vanaf 250kg via HobbyFarming.nl.

Voerschema schapen

Gras blijft de belangrijkste voedingsbron voor schapen, maar gras, kuilvoer en hooi bevatten vaak te weinig mineralen of de mineralen in de verkeerde verhoudingen. Vers gras kan, afhankelijk van de grondsoort of het onderhoud van de weide, niet altijd voldoen aan alle eisen voor een gezond rantsoen. De juiste mineralenvoorziening bij schapen voorkomt klauwproblemen, vruchtbaarheidsproblemen en problemen rond het aflammeren. Een goed rantsoen tijdens de dracht zorgt voor actieve lammeren met een goed geboortegewicht. Middels onderstaand schema bieden wij u graag een richtlijn in welke fase u welke voeders kunt inzetten.

Verzorging ooiën zonder lammeren

Gras biedt buiten de dracht- en zoogperiode vaak wel voldoende eiwit en energie voor de schapen, maar voorziet onvoldoende in de juiste mineralen. Dit kan worden aangevuld door een mineralenemmer ter beschikking te stellen of door dagelijks ca. 100 tot 150g **Schapenbrok Conditie** per schaap bij te verstrekken. (Dit is gelijk aan 1 kilo brok per 6 tot 10 schapen).

Wij hebben de volgende likemmers beschikbaar:

PRV19002 Rupromin Sheep (emmer Provimi)	12,5kg
53600 Blockemel Ovina + Koper Mineralenemmer	20kg

Ooien rond het dekken

De conditie van schapen wordt meestal gescoord van 1 (broodmager) tot en met 5 (te vet). De ideale conditie bij dekken is 3 à 3,5. Flushing betekent energierijk voeren in de dekfase, waardoor de ooiën maximale eisprong zullen hebben. Laat de ooiën 2 à 3 weken voor het dekken op een schrale weide lopen en voer in die fase niet bij. Verplaats ze naar een verse (rijke) weide en voer 250g **Schapenbrok Lacto** per ooi per dag bij in de dekfase. Flushen kan het aantal lammeren per schaap met gemiddeld een half lam vergroten.

Drachtige ooiën

Schapenbrok Lacto is sterk aan te raden om te voeren bij hoogdrachtige ooiën ter voorkoming van slepende melkziekte (en melkziekte), het stimuleert bovendien indirect uniformiteit en de vitaliteit van de lammeren. Aan te raden is om de ooiën tijdig 's nachts naar binnen te halen om de voerovergang van gras naar kuil/hooi niet te abrupt te maken en problemen zoals slepende melkziekte te voorkomen.

Tot 4 weken voor werpen	Voer afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van het ruwvoer 100 tot 150g Schapenbrok Conditie bij om te voorzien in noodzakelijke vitaminen en mineralen. Alternatief is het onbeperkt aanbieden van een mineralenemmer.
4 weken voor lammeren	Verstrek 150 - 200g Schapenbrok Lacto per ooi per dag naast weidegang of onbeperkt goed ruwvoer op stal.
3 weken voor aflammeren	Verstrek 300g Schapenbrok Lacto per ooi per dag naast weidegang of onbeperkt goed ruwvoer op stal.
2 weken voor aflammeren tot aflammeren	Zet de ooiën op stal. Verstrek 400g Schapenbrok Lacto per ooi per dag naast onbeperkt goed ruwvoer, eventueel tot 600g als een drieling wordt verwacht. Let extra op schimmelplekken in het kuilvoer omdat dit verwerpen kan veroorzaken (Listeria)



Zogende oaien

Schapenbrok Lacto is een energierijke en eiwitrijke korrel voor een hoge melkgift, het bevat een hoog gehalte aan glucogene energie. Zorg voor Onbeperkt schoon drinkwater: een melkgevend schaap drinkt tot 10 liter water per dag.

1e week na aflammeren	Schapenbrok Lacto: 400g per dag bij een eenling, 600g per dag bij een tweeling en maximaal 1 kg per dag bij een drieling. Verzorg het derde lam met kunstmelk*
2^e week na aflammeren tot spenen /einde zogen (tot 6 a 8 weken)	Lammerenkorrel Schaap/Geit: 600g per dag bij een eenling, 1kg per dag bij een tweeling en maximaal 1,5kg per dag bij een drieling. Verzorg het derde lam met kunstmelk*

*) Zeer belangrijk na de geboorte van de lammeren is een tijdige biestopname. Het lam moet in de eerste 24 uur na de geboorte ongeveer 1000 ml biest opnemen. Op deze manier krijgt het lam voldoende weerstand mee. Vanaf de derde levensdag tot de leeftijd van zes maanden kan **Lammerenkorrel Schaap/Geit** gevoerd worden.

Een goed gevoerde ooi kan twee of soms drie lammeren zogen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie de lammeren te weinig melk krijgen of dat het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval is het zinvol om het derde lam op te fokken met kunstmelk. Als u twee gelijkwaardige lammeren bij de ooi houdt dan kan het derde lam volledig met kunstmelk groot worden gebracht. Dat kan dus het kleinste of juist het grootste lam zijn!

Kunstmelk (bij)voeren aan lammeren

De bereidingswijze van de kunstmelk vindt u op het etiket en op onze website.

Verstrek de eerste dag zoveel biest als het lam wil drinken (minimaal 3 x daags aanbieden). Indien er geen moederbiest beschikbaar is, adviseren wij kunstbiest **Farm-O-San Kubilam** of **Farm-O-San Colostrum**.

Dag 2 tot 4	3 x daags Novilam 50 Lammerenmelk zoveel als lam wil drinken
Dag 5 tot 8	3 x daags 300 cl Novilam 50 Lammerenmelk
Dag 9 tot 21	3 x daags 300 cl of 2 x daags 400 cl Novilam 50 Lammerenmelk
21 dagen tot een gewicht van 10 kg	3 x daags 400 cl of 2 x daags 600 cl Novilam 50 Lammerenmelk
Vanaf 10kg lichaamsgewicht	2 x daags 400 cl Novilam 50 Lammerenmelk
Laatste week voor spenen	1 x daags 400 cl Novilam 50 Lammerenmelk

Opfok oilammeren

De ontwikkeling van oilammeren die u wilt aanhouden, verloopt het beste bij weidegang. Verstrek Afhankelijk van de kwaliteit van het gras in de wei krijgen lammeren minimaal 200-300 gram **Lammerkorrel Schaap/Geit** bij. Hierop groeien de ootjes in een mooi geleidelijk tempo zonder problemen.

Afmesten van lammeren (met weidegang)

Het ideale aflevergewicht voor een ooi ligt op 35-38 kg en voor een ram op 38-42 kg. Verstrek afhankelijk van de kwaliteit van het gras in de wei de lammeren minimaal 250 gram per dag **Lammerkorrel Groei**.

Lammerenkorrel Groei is;

- Hoogenergetische samenstelling voor sterk beveleesde vleeslammeren
- Ideaal voer om ook oude oaien of weiderammen in een korte tijd slachtrijp te maken
- Veilig voeder dat helpt nierstenen te voorkomen

Afmesten van lammeren (op stal)

Bij de intensieve methode worden de lammeren afgemest op de stal. Deze methode wordt vaak ingezet bij kruislingsrassen zodat de hoogste groei wordt gehaald. Bij deze methode wordt na het spenen 250 gram **Lammerkorrel Groei** per lam per dag gevoerd. Bij voldoende karkasontwikkeling kunnen de lammeren binnen een tijd van drie à vier weken op stal gemest worden. De krachtvoer gift kan in enkele dagen opgebouwd worden naar onbeperkt **Lammerenkorrel Groei** in combinatie met schoon drinkwater en voldoende aanbod van gras of kuilvoer.