



kalvervoer.nl

Voerschema Kalveren regulier

Biest	Meet de biestkwaliteit met een refractometer . Verbeter de biest met een lage Immunoglobine G (IgG) waarde (Brix waarde lager dan 20) door toevoeging van Farm-O-San Colostrum , of zet volledig een biestvervanger in zoals Farm-O-San Colostrum . Dag 1: 3 tot 4 maal daags 1,5L biest per voeding, Dag 2: 3 tot 4 maal daags 1,5 tot 2L biest per voeding					
Kalf aan de melk	Week	Dosering Vite Milk*	Liter / voeding	Voedingen / Dag	Krachtvoer	Ruwvoer
	1	125 g / L	2	2 - 3	Vité Kalvermuesli Start met Fir** onbeperkt aanbieden. Vité Kalvermuesli Start met Fir** hoeveelheid geleidelijk verhogen tot 750g per dag en daarboven aanvullen met BabyKalverkorrel Préstart tot onbeperkte opname. De opname moet minimaal 2kg per dag zijn bij 10 weken leeftijd. <i>(bij geen problemen met diarree kan Babykalverkorrel Préstart ook alleen ingezet worden)</i>	Goed Ruwvoer in de vorm van hooi, gehakseld stro of Hartog luzernehooi onbeperkt aanbieden voor optimale pensontwikkeling
	2	125 g / L	2,5	2		
	3	125 g / L	3	2		
	4	125 g / L	3 - 4	2		
	5	125 g / L	3 - 4	2		
	6	125 g / L	3 - 4	2		
	7	125 g / L	3 - 4	2		
	8	125 g / L	2,5	2		
	9	125 g / L	2,5	1		
10	125 g / L	1,5	1			

***Vite Milk** is er in 2 varianten. **Vite Milk plus** is een product op basis van wei-eiwitten en **Vite Milk 40MMP** bevat 40% magere melkpoeder. Beide varianten zijn prima oplosbaar. De magere melkpoeder in **Vite Milk 40MMP** zorgt voor stremming in de lebmaag. Daardoor kan het eiwit al in de lebmaag voorverteren, is de toevoer naar de dunne darm gelijkmatiger en gaat de verdere vertering in de dunne darm nog gemakkelijker. Zeker bij meer bevestigde rassen zoals Fleckvieh heeft een product met magere melkpoeder de voorkeur omdat het zorgt voor een snellere en betere bespiering.

Beide melkpoeder varianten zijn te voeren in een regulier schema (125 gram poeder per liter melk) of een intensief schema (140 gram poeder per liter melk). Wij adviseren u graag over de juiste keuze voor uw kalveropfok.

** **Vité Kalvermuesli Start met Fir** gaat diarree tegen. Deze kalvermuesli kan vanaf de eerste levensdagen worden gevoerd. Start met een paar handjes per dag en verhoog dit geleidelijk naar 750 gram per dag. Bij 750 gram krijgen de kalveren voldoende FIR binnen om de darmen maximaal actief en gezond te houden. Het is aan te bevelen dat de kalveren in de eerste 10 weken minimaal 10kg (een halve zak) **Vité Kalvermuesli Start met Fir** opgenomen hebben.





kalvervoer.nl

Bereidingswijze melk:

- Meng melkpoeder met een watertemperatuur van 45° tot 50°C.
Drinktemperatuur: 39° to 41°C
- Let op de correcte concentratie: In één liter melk bevat 125 gram poeder. 125g poeder + 875ml water: 1,25kg melkpoeder + 8,75L water maakt 10 liter melk
- Bij een automaat die ingesteld wordt met een hoeveelheid poeder per liter water, voegt u 143g melkpoeder per liter water toe.
- Gebruik altijd vers en schoon drinkwater.
- Kapotte spenen bij speenemmer of automaat direct vervangen.
- Indien de dagtemperatuur <0°C is, de voerhoeveelheid met minimaal 10% verhogen om de aan de benodigde extra energievoorziening te voldoen.
- Vanaf de 2^e week is het goed om vers drinkwater te verstrekken. Let op de temperatuur van het water. Het drinken van te koud water kost het kalf veel energie om dit in het lichaam op te warmen.

Gespeend	leeftijd	Krachtvoer	Ruwvoer
	Vanaf de 11 ^e week t/m 6 maanden	Vite Kalvermuesli Groei of Kalverbrok Groei of een combinatie van beide. De opname op de speenleeftijd moet minimaal 2kg per dag zijn. Het krachtvoer mag onbeperkt worden aangeboden tot een maximum van 2kg per 100kg lichaamsgewicht per dier per dag om te voorkomen dat de pinken te vet worden. Op 6 maanden leeftijd is het jongvee groot en sterk genoeg om op een mooi gemengd rantsoen van de koeien over te gaan	Onbeperkt goed ruwvoer

Dit voerschema is een advies. Aanpassing van het schema is afhankelijk van de gezondheid en het gewicht van het kalf!

Kalvervoer.nl
Kapelweg 9
7065 AN Sinderen
Tel. 0315 – 230083
info@voerwaarts.nl

Wist u dat...

- Kalveren de eerste 12 uur de meeste antistoffen uit de biest op kunnen nemen;
- Biest 48 uur te bewaren is bij 4°C ofwel 1 jaar bij -21°C;
- De ontwikkeling en aanzet van het uierweefsel wordt bepaald in de melkperiode;
- Onderzoek heeft aangetoond dat kalveren die 670 gram per dag groeiden ten opzichte van kalveren die 400 gram per dag groeiden, gemiddeld 500 liter per lactatie meer geven.

